

CUADRUPLE TERAPIA PARA EL TRATAMIENTO ERRADICADOR DE H. PYLORI

IV CONFERENCIA ESPAÑOLA DE CONSENSO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR H. PYLORI

Es importante un buen cumplimiento del tratamiento, tanto en la pauta como en su duración, para garantizar la efectividad del mismo.

Pauta: La siguiente tabla le muestra cuales son los compuestos que componen el tratamiento y sus dosis de ingesta:

- ✓ **ANTIBIOTICOS** (Amoxicilina – Claritromicina – Metronidazol): deben ingerirse **antes de las comidas**.
- ✓ **PROTECTOR DE ESTOMAGO** (Esomeprazol): debe ingerirse **antes de las comidas**.

14 Días de Tratamiento	DESAYUNO	COMIDA	CENA
AMOXICILINA 1g	1 COMP	-	1 COMP
CLARITROMICINA 500 mg	1 COMP	-	1 COMP
METRONIDAZOL 250 mg	2 COMP	-	2 COMP
ESOMEPRAZOL 40 mg	1 COMP	-	1 COMP

Ayúdese de un vaso lleno de agua para la realización de las ingestas.

Duración: 14 días

Advertencias:

1. Durante los días de tratamiento **NO** puede tomar **alcohol**.
2. Si toma lovastatina, simvastatina o colchicina deberá suspenderla durante los 14 días que dura su tratamiento y reiniciarlo dos días después de haber terminado dicho tratamiento.
3. En ocasiones, este **tratamiento puede provocar diarrea**, dolor abdominal o alteraciones del gusto. **Pero evite suspender el tratamiento**. Para facilitarle la regeneración de flora gastrointestinal **puede tomar el probiotico GASTRUS**. Dicho probiotico suele tomarse a primera hora de la mañana y su toma debe separarse 2h respecto de la toma de los antibióticos.