

BUDESONIDA VISCOSA 0,25mg/ml GEL ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensiones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

240 ml

COMPOSICIÓN:

BUDESONIDA	60mg
XANTANO, GOMA DE	4.8g
SACARINA SÓDICA	180mg
SODIO BENZOATO	450mg
GLICEROL	24ml
EDETATO DE DISODIO	240mg
AGUA PURIFICADA c.s.p.	240ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES

- Esofagitis eosinofílica.

POSOLOGÍA:

Niños menores de 10 años: 1mg/día (utilizar la preparación de budesonida 0,125mg/ml, 8ml/24h).

Niños mayores de 10 años y adultos: 2mg/día (utilizar la preparación de budesonida 0,250mg/ml, 8ml/24h)

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Tras la administración, no comer ni beber en una hora para favorecer el efecto del medicamento sobre la mucosa esofágica.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

Ver indicaciones y posología.

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES:

- Tuberculosis pulmonar, infecciones fúngicas o virales de las vías respiratorias.
- Este medicamento puede producir dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea porque contiene glicerol.

INTERACCIONES:

Ketoconazol, Itraconazol, ritonavir, saquinavir, eritromicina, claritromicina, estrógenos y anticonceptivos esteroideos.

REACCIONES ADVERSAS:

Sequedad de boca, irritación de garganta, ronquera, dolor de cabeza, micosis oral, candidemia orofaríngea, dificultad para tragar, tos.

CONSERVACION:

Conservar a en nevera (2-8°C) protegido de la luz y la humedad.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 90 días desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

14/03/2021